

Farmaci

Inverno		Primavera			Estate			Autunno		Inverno	
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Api-Bioxal* Api-Bioxal* <small>soluzione pronta all'uso</small>			[Api-Bioxal* Api-Bioxal* <small>soluzione pronta all'uso</small>]			[Api-Bioxal* Api-Bioxal* ApiLifeVar Apifor]				[Api-Bioxal* Api-Bioxal* <small>soluzione pronta all'uso</small>]	
* Solo in caso non sia stato effettuato a nov.-dic. in assenza di covata			* Su sciami o nuclei in assenza di covata			* In assenza di covata			* In assenza di covata		

Nutrimenti

Inverno		Primavera			Estate			Autunno		Inverno	
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ApiCandy	ApiCandy ApiCandy <small>PROTEICO</small>	ApiCandy <small>PROTEICO</small> ApiHerb Micostop ApiGo SuperBee	ApiHerb Micostop ApiGo SuperBee			ApiCandy* ApiHerb	ApiCandy* ApiHerb SuperBee	ApiHerb ApiGo SuperBee	ApiCandy ApiCandy <small>PROTEICO</small> ApiGo		ApiCandy
						* Durante e dopo i trattamenti					



- Eseguire il trattamento con **temperature medie** comprese tra **15 e 30°C**;
- effettuare il trattamento possibilmente la mattina presto o la sera tardi;
- trattare simultaneamente tutte le arnie dell'apiario;
- effettuare il trattamento in assenza di melario;
- possibilmente alimentare durante e dopo il trattamento con ApiCandy, ApiCandy PROTEICO o con altro mangime in base alle necessità del periodo (es. ApiHerb).



- Effettuare il trattamento possibilmente in assenza di covata opercolata (efficacia superiore al **95%**);
- Vantaggi del blocco di covata:
 - prolunga la vita delle api;
 - permette un maggior accumulo di riserve per superare l'inverno;
 - non è necessario rimuovere il melario durante il blocco;
- Api-Bioxal polvere sublimato: si consiglia l'uso di sublimatori a resistenza elettrica quali **Oxalika Premium** e **Oxalika PRO**:
 - pulire lo scodellino ad ogni applicazione;
- effettuare il trattamento in assenza di melario.

BUSTA 35 g + SCIROPPO 500 ml	BUSTA 175 g + SCIROPPO 2500 ml	BUSTA 350 g + SCIROPPO 5000 ml
Acqua: 308,6 ml	Acqua: 1543,2 ml	Acqua: 3086,4 ml
+	+	+
Zucchero: 308,6 g	Zucchero: 1543,2 g	Zucchero: 3086,4 g
+	+	+
Api-Bioxal: 35 g	Api-Bioxal: 175 g	Api-Bioxal: 350 g



- Effettuare il trattamento possibilmente in assenza di covata opercolata (efficacia superiore al **95%**);
- Vantaggi del blocco di covata:
 - prolunga la vita delle api;
 - permette un maggior accumulo di riserve per superare l'inverno;
 - non è necessario rimuovere il melario durante il blocco;
 - controllo accurato del nido da parte dell'apicoltore.
- Effettuare il trattamento in assenza di melario.

🕯 I VANTAGGI DEL GLICEROLO:

- eccipiente sicuro per le api;
- rispetto allo zucchero non si degrada in ambiente acido, quindi non forma composti tossici per le api (HMF);
- elevata azione igroscopica anche in condizioni di bassa umidità relativa (Milani 2001).



- Eseguire il trattamento con **temperature medie** comprese tra **10 e 30°C**;
- utilizzare evaporatori idonei e testati (es. Aspro-Novar-form);
- lasciare l'evaporatore fino a completa evaporazione del prodotto;
- possibilmente alimentare prima e dopo il trattamento con ApiCandy, ApiCandy PROTEICO o con altro mangime in base alle necessità del periodo (es. ApiHerb).
- effettuare il trattamento in assenza di melario.
- riempire l'evaporatore con il volume indicato nell'etichetta del medicinale:

ARNIA	DOSAGGIO CONSIGLIATO
DADANT	250 ml
DADANT + MELARIO VUOTO	380 ml
PORTACIAMI POLISTIROLO	130 ml

- Eseguire il trattamento con temperatura **>10°C** per permettere voli durante il periodo di somministrazione;
- aiuta le api adulte a mantenere un intestino sano;
- **preparare** la sospensione **12 ore prima dell'uso** conservandola in luogo fresco ed al buio, fino al momento della somministrazione. Utilizzarla **non oltre le 48 ore**.
- **COME SI USA:**
 - **Uso consigliato tramite gocciolamento:** mescolare **4 g di ApiHerb in 50 ml di sciroppo zuccherino**. Gocciolare **50 ml** di questo preparato direttamente sopra i telaini. **Ripetere** per almeno **3 volte** a distanza settimanale.
 - **Uso alternativo tramite nutrito:** mescolare **10 g di ApiHerb in 1 litro di sciroppo zuccherino**. Somministrare circa **1,5 lt** di questo preparato per arnia.
 - Si sconsiglia l'uso di nutritori a goccia.

- Assicura l'**apporto energetico** alle famiglie nel periodo **autunno/invernale**;
- Utile aiuto alle famiglie con **scarse riserve** di miele.
- **COME SI USA**
 - Aprire/forare la confezione e somministrarlo tal quale alle api su copri favo o direttamente sopra i telaini da nido.

PROTEICO

- Oltre all'apporto energetico fornisce **proteine** per sostenere l'**allevamento della covata** nei periodi di inizio-fine inverno
- Utile alle famiglie con **poche riserve di polline** o con scarsa importazione pollinifera.
- **COME SI USA**
 - Aprire/forare la confezione e somministrarlo tal quale alle api su copri favo o direttamente sopra i telaini da nido.

- Integrazione di **amminoacidi, sali minerali e vitamine** indispensabili alle api.
- Utile aiuto alle famiglie con poche riserve di polline o nei periodi di scarsa importazione pollinifera.
- **Stimola lo sviluppo della famiglia**, somministrare a primavera prima delle principali fioriture e/o a fine estate/autunno in vista dell'invernamento delle colonie.
- **COME SI USA:**
 - Mescolare **10 ml** di SuperBee in **1 litro di sciroppo zuccherino**.
 - È possibile utilizzarlo con **qualsiasi tipo di nutrito**, con nutritori a tasca assicurarsi di associare **dispositivi anti annegamento**.

- Supporto nutrizionale alle famiglie che si presentano deboli all'uscita dell'inverno.
- **COME SI USA:**
 - Mescolare **10 ml** di Micostop in mezzo litro di sciroppo zuccherino, somministrare questa quantità tramite nutrito una volta a settimana per 3 volte.
- **ApiGo**
 - **Incrementa le performances** dell'alveare e della forza della famiglia.
 - Preparare la sospensione **12 ore prima dell'uso** conservandola in frigorifero. Utilizzarla non oltre le 48 ore.
 - **COME SI USA:**
 - **20 g di APIGO in 1 litro d'acqua**. Gocciolare circa **5 cc** di sospensione **su ogni telaino popolato di api**, una volta alla settimana per **3 settimane**.
 - Per somministrarlo su adulti e favi sospendere la busta in 4 litri d'acqua, spruzzando ogni alveare con 200 ml della preparazione.